

	PRECONISATIONS POUR LE PATIENT RECHERCHE RESPIRATOIRE D'HELICOBACTER PYLORI	Référence : INSPRE052 Version : 2.4 Application : 2022-12-19
---	--	---

- **A JEUN STRICT – minimum 6 heures** (ni aliment, ni boisson, ni tabac)
- Se présenter au laboratoire (avec ou sans rendez-vous selon le laboratoire) **avec le coffret prescrit par un médecin** (délivrance au préalable en pharmacie sur présentation de l'ordonnance).
ATTENTION : si test INFAL, apporter 200 ml (à partir de 12 ans) ou 100ml (de 3 à 11ans) de jus d'orange (100% concentré).
HELIKIT à partir de 15 ans – INFAL adultes à partir de 12 ans – INFAL enfants de 3 à 11 ans

Laboratoire de Bassens : 04.79.60.02.72
 Laboratoire du Grand Verger : 04.79.96.04.14
 Laboratoire de La Motte-Servolex : 04.79.25.98.64
 Laboratoire Tercinet : 04.79.33.75.25
 Laboratoire du Médipôle de Savoie : 04.79.26.84.84
 Laboratoire de Chambéry le Haut : 04.79.68.60.55
 Laboratoire de Belley : 04.79.87.28.82
 Laboratoire de Yenne : 0479.36.74.05

➤ **Arrêt des médicaments suivants :**

- **Antibiotiques** (quels qu'ils soient)
A arrêter **4 semaines minimum** avant le test.

- **Inhibiteurs de la pompe à protons**
A arrêter **2 semaines minimum** avant le test.
Omeprazole (Mopral; Zoltum)
Lansoprazole (Lanzor, Ogast)
Esomeprazole (Inexium)
Rabeprazole (Pariet)
Pantoprazole (Inipomp, Eupantol)
Etc.

- **Anti-acides et pansements gastro-intestinaux**
A arrêter **24 heures minimum** avant le test.
Maalox, Rennie, Smecta etc.

REMARQUES :

- La réalisation du test sera effectuée selon le mode d'emploi du kit utilisé
- La prise d'antagonistes des récepteurs H2 à l'histamine (cimétidine, ranitidine ...) n'est plus contre indiquée avant le test.